

Технические средства обеспечения искусственного питания



- Капельницы, зонды, контейнеры;
- Наборы для чрезкожной эндоскопической гастро- и еюностомии;
- Наборы для лапароскопическойгастро- и еюностомии;
- Наборы для игольчатой еюностомии;
- Насосы–дозаторы для внутривенного и внутрикишечного введения питательных смесей

Рекомендуемая продолжительность использования зондов для ЭП в зависимости от используемых материалов

Зонды	Максимальная длительность использования, сутки
ПХВ (фталаты)	5
ПХВ (полиадипаты)	15
Силиконовые	30
Полиуретановые	45

Примечания:

- согласно международному стандарту при необходимости проведения больным зондового питания продолжительностью более 3-4 недель показано наложение стомы;
- представленные сроки применения указанных зондов основываются на нашем опыте их применения.

Показания для наложения стомы:

- Необходимость длительного зондового питания (более 4 недель).
- Функционально состоятельный ЖКТ.
- Невозможность установки назогастрального или назоинтестинального зонда (поражение ротоглотки, выраженная обструкция пищевода, стенозирование просвета желудка, поражение слизистых верхних отделов ЖКТ на фоне химиотерапии).

Преимуществами ЧЭГ являются: меньшая травматичность, возможность относительно быстрого наложения гастростомы, низкая стоимость, ранняя адаптация пациентов, а также высокая устойчивость используемых материалов к агрессивным средам. Показания и противопоказания для наложения ЧЭГ представлены в табл. 6.

Таблица 6

Показания и противопоказания для наложения ЧЭГ

ПОКАЗАНИЯ	
1. Нарушение глотания, обусловленное неврологической патологией (50%)	
2. Опухоль в верхних отделах желудочно-кишечного тракта (30%).	
3. Челюстно-лицевые травмы и хирургические вмешательства при них.	
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	
Абсолютные	Относительные
<ul style="list-style-type: none">• Глоточная или пищеводная обструкция, не позволяющая выполнить ФГС• Коагулопатия (ПТИ менее 70%, тромбоциты - менее 150×10^9 л, фибриноген < 2 г/л)• Ожидаемая продолжительность жизни пациентов менее 2-3 мес.• Перитонит.• Общие противопоказания для проведения зондового питания	<ul style="list-style-type: none">• Перитонеальный канцероматоз• Выраженный асцит• Перитонеальный диализ• Язвенная болезнь желудка• Анатомические дефекты в результате предыдущих операций на органах брюшной полости• Спаечная болезнь• Выраженная портальная гипертензия и гепатомегалия• Морбидное ожирение (3 ст.)